

PANADOL™ Soluble (Paracetamol)
ПАНАДОЛ™ Разтворим (Парацетамол)

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

Състав: Всяка разтворима таблетка съдържа Paracetamol 500 mg.

Също така съдържа сорбитол, натриев захарин, повидон, натриев лаурил сулфат, диметикон, лимонена киселина и натриев карбонат.

Показания: Panadol Soluble е обезболяващо и температуропонижаващо средство и е показан за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъбобол, невралгия, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, дисменорея, болки при възпалено гърло.

Характеристики: Panadol Soluble съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Panadol Soluble не дразни стомаха.

Противопоказания: **Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.** Не взимайте Panadol Soluble, ако сте алергични към парацетамол.

Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, но тези промени не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

Противопоказания / предупреждения при употреба: Преди да вземете Panadol Soluble, консултирайте се с Вашия лекар, ако имате остро бъбречно или чернодробно заболяване, или ако взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин. Ако взимате антикоагуланти - лекарства, използвани за разреждане на кръвта, и трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период, може да приемате обичайните дози парацетамол. Ако сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Panadol Soluble.

Всяка таблетка съдържа 427mg / за таблетка натрий (854mg натрий за доза от две таблетки). По тази причина лекарственият продукт не е подходящ за лица на нискосолева диета.

Дозировка:

Възрастни - 1-2 таблетки, разтворени в чаша с вода, на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки за период от 24 часа.

Деца (6 до 12 години) - 1/2 до 1 таблетка да се разтвори в чаша с вода и да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа.

Не давайте на деца повече от 3 дни без консултация с лекар.

Да не се дава на деца под 6 годишна възраст, освен по лекарско предписание. Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Не надвишавайте посочената доза. Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Нежелани лекарствени реакции: При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

Срок на годност: Не използвайте след датата, посочена на опаковката.
Срок на годност - 4 години.

Условия на съхранение: Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd.,
Brentford, TW8 9GS, UK

Panadol™ е търговска марка.