

**PANADOL\* TABLETS (Paracetamol)**  
**ПАНАДОЛ\* ТАБЛЕТКИ (Парацетамол)**

---

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

**Състав:** Всяка таблетка съдържа  
Paracetamol 500 mg.

Също така съдържа нишесте, царевично нишесте, поливидон, натриев сорбат, талк, стеаринова киселина, вода, хидроксипропил метилцелулоза, триацетин.

**Показания:** Panadol облекчава слабата до умерена болка от различен произход (напр. болката при главоболие, мигрена, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, невралгия, зъбобол и менструални болки) и понижава високата температура.

**Характеристики:** Panadol съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Panadol не дразни стомаха и таблетките са с овална форма, което улеснява тяхното преглъщане.

**Противопоказания:** **Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.** Не взимайте Panadol, ако сте алергични към парацетамол или някоя от другите съставки, посочени по-горе. Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, но тези промени не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

**Противопоказания / предупреждения при употреба:** Преди да вземете Panadol, консултирайте се с Вашия лекар, ако имате остро бъбречно или чернодробно заболяване, ако взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин. Ако взимате антикоагуланти - лекарства, използвани за разреждане на кръвта, и трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период, може да приемате обичайните дози парацетамол. Ако сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Panadol.

**Дозировка:**

**Възрастни** - 2 таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки за период от 24 часа.

**Деца (6 до 12 години)** - 1/2 до 1 таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа. Не давайте на деца повече от 3 дни без консултация с лекар. Да не се дава на деца под 6 годишна възраст, освен по лекарско предписание. Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

**Не надвишавайте посочената доза.** Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

**Нежелани лекарствени реакции:** Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

**Срок на годност:** Не използвайте след датата, посочена на опаковката.  
Срок на годност - 5 години.

**Условия на съхранение:** Да се съхранява при температура под 25°C.

**Да се пази на места, недостъпни за деца.**

**Притежател на разрешението за употреба:**  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,  
Brentford, TW8 9GS, UK

Panadol\* е търговска марка.