

**PANADOL\* Baby suppositories (Paracetamol)**  
**ПАНАДОЛ\* за бебета супозитории (Парацетамол)**

---

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

**Какво съдържа Panadol Baby супозитории?**

Всяка супозитория съдържа 125 mg. paracetamol.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

Предлага се в опаковки съдържащи 10 супозитории.

**За какво се прилага Panadol Baby супозитории?**

Panadol Baby е предназначен за деца на възраст от 3 месеца до 3 години. Облекчава лека до умерена болка при никнене на зъбки, зъбобол, главоболие и възпалено гърло и понижава температурата при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили. Също така се препоръчва за понижаване на високата температура като пост-ваксинална реакция при деца над 3 месеца.

**Как действа Panadol Baby супозитории?** Panadol Baby съдържа парацетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и понижава повишената температура. Panadol Baby супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при преглъщане или повръща.

**ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА ДАДЕТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО**

**Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.**

Не давайте Panadol Baby на деца, алергични към парацетамол или към помощната съставка.

**Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете Panadol Baby супозитории?**

- ако детето има остро бъбречно или чернодробно заболяване.

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага при пациенти с диария, наскоро прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

**Начин на приложение:** Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сгъне краката възможно най-близо под брадичката.

**Дозировка: Деца от 3 месеца до 3 години:**

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето. Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема - 15 mg/kg еднократна доза. Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.

Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар. Да не се дава на деца под 3 месеца освен по лекарско предписание.

**Не надвишавайте посочената доза.** Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре. Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.

Да не се приема през устата.

**Какви нежелани лекарствени реакции биха могли да се наблюдават при Panadol Baby**

**супозитории:** Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

**Срок на годност:** Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

**Условия на съхранение:** Да се съхранява при температура под 25°C.

**Да се съхранява на места, недостъпни за деца.**

**Притежател на разрешението за употреба:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,

GlaxoSmithKline Export Ltd.,

Brentford, TW8 9GS, UK

Последна редакция на листовката Октомври 2005.

Panadol\* е търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies. / GSK logo