

PANADOL* Junior suppositories (Paracetamol)
ПАНАДОЛ* за деца супозитории (Парацетамол)

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

Какво съдържа Panadol Junior супозитории?

Всяка супозитория съдържа 250 mg. paracetamol.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

Предлага се в опаковки, съдържащи 10 супозитории.

За какво се прилага Panadol Junior супозитории?

Panadol Junior е предназначен за деца на възраст от 3 години до 12 години. Облекчава лека до умерена болка при зъбобол, главоболие и възпалено гърло и понижава високата температура при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили.

Как действа Panadol Junior супозитории? Panadol Junior съдържа парацетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и повишена температура. Panadol Junior супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при преглъщане или повръща.

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА ДАДЕТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не давайте Panadol Junior на деца, алергични към парацетамол или към помощната съставка.

Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете Panadol Junior супозитории?

- ако детето има остро бъбречно или чернодробно заболяване.

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага при пациенти с диария, наскоро прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

Начин на приложение: Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сгъне крака възможно най-близо под брадичката.

Дозировка: Деца от 3 до 12 години:

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето. Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема - 15 mg/kg еднократна доза. Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.

Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар. Да не се дава на деца под 3 години освен по лекарско предписание.

Не надвишавайте посочената доза. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре.

Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.
Да не се приема през устата.

Какви нежелани лекарствени реакции биха могли да се наблюдават при Panadol Junior супозитории: Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

Срок на годност: Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

Условия на съхранение: Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, UK

Последна редакция на листовката Октомври 2005.

Panadol* е търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies. / GSK logo