

**PANADOL\* Baby suspension (Paracetamol)**  
**ПАНАДОЛ\* за бебета суспенсия (Парацетамол)**

---

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

**Какво съдържа Panadol Baby суспенсия?**

Всяка доза от 5 ml съдържа 120 mg. paracetamol (1 ml съдържа 24 mg).

Също така съдържа като помощни вещества малеинова киселина, азорубин (E122), ксантанова гума, малтитол, сорбитол, натриев нипасепт, лимонена киселина, есенция с яagodов аромат (L10055) и вода.

Предлага се в опаковки от 100 мл. и 300 мл.

**За какво се прилага Panadol Baby суспенсия?**

Panadol Baby е предназначен за деца на възраст от 2 месеца до 12 години. Облекчава болката при никнене на зъбки, зъбобол и възпалено гърло и понижава температурата при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили. Също така се препоръчва за понижаване на високата температура като пост-ваксинална реакция при деца над 2 месеца.

**Как действа Panadol Baby суспенсия?** За деца на възраст от 2 до 3 месеца – Единична доза от 2.5 ml (120mg / 5ml) за симптоматично облекчаване на нежеланите реакции след ваксинация. Ако високата температура продължи и след приемане на втора доза Panadol Baby, трябва да се потърси консултация с лекар. За други индикации да се прилага само по лекарско предписание.

Panadol Baby е суспенсия с приятен яagodов вкус, без захар и алкохол и съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Panadol Baby не дразни стомаха и лесно се дозира.

**ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА ДАДЕТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО**

**Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.**

Не давайте Panadol Baby на деца, алергични към парацетамол или някоя от помощните съставки.

**Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете Panadol Baby суспенсия?**

- ако детето има остро бъбречно или чернодробно заболяване или взема други лекарства. Суспенсията съдържа като помощно вещество азо оцветител, който може да причини алергичен тип реакции, включително астма. Рискът от алергия е по-висок при алергични към аспирин пациенти.

**Как трябва да се дава Panadol Baby суспенсия?**

**Препоръчвана дозировка за Panadol Baby суспенсия 120mg/5ml?**

Типично тегло	Възраст	Дозировка (ml)
4 – 6 кг	2 месеца	2.5
6 – 8 кг	3 – 6 месеца	4.0
8 - 10 кг	6 – 12 месеца	5.0
10 – 13 кг	1 – 2 години	7.0
13 – 15 кг	2 – 3 години	9.0
15 – 21 кг	3 – 6 години	10.0
21 – 29 кг	6 – 9 години	14.0
29 – 42 кг	9 – 12 години	20.0

За деца на възраст от 2 до 3 месеца – Единична доза от 2.5 ml (120mg / 5ml) за симптоматично облекчаване на нежеланите реакции след ваксинация. Ако високата температура продължи и след приемане на втора доза Panadol Baby, трябва да се потърси консултация с лекар. За други индикации да се прилага само по лекарско предписание.

Измерете препоръчаната дозировка, посочена в горната таблица въз основа на теглото на детето. Ако не сте сигурни за теглото на детето, използвайте неговата възраст за определяне на дозата. Използвайте приложената в опаковката пипета. Изтеглете суспензия от шишето до съответната линия на скалата. Повторете, ако е необходима доза, по-голяма от 8 мл. След употреба, пипетата трябва да се измие с топла вода и да изсъхне.

Тази доза може да бъде повтаряна на всеки 4 часа при необходимост. Не давайте повече от 4 дози за период от 24 часа. Да не се дава на интервали, по-кратки от 4 часа. Panadol Baby не трябва да се дава на деца повече от 3 дни без консултация с лекар. Panadol Baby не трябва да се дава на деца по-малки от 2 месеца, освен по лекарско предписание.

Ако бебето Ви е родено преждевременно, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате Panadol Baby.

**Не надвишавайте посочената доза.** Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре.

**Какви нежелани лекарствени реакции биха могли да се наблюдават при Panadol Baby суспензия:** Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции. Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, но тези промени не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

**Срок на годност:** Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

Срок на годност – 3 години.

**Условия на съхранение:** Да не се замразява. Да се пази от директна светлина. Да се съхранява при температура 25°C.

**Да се съхранява на места, недостъпни за деца.**

**Притежател на разрешението за употреба:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, UK

Последна редакция на листовката Април 2005.

Panadol\* е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.